

## DOŠKOLOVÁNÍ LÉKAŘŮ – KONTROLNÍ TEST

### ATOPICKÁ DERMATITIDA V ROCE 2009

1. **Společně rysy pro všechny formy atopické dermatitidy jsou:**
  - a) pruritus, chronická dermatitida, pozitivita specifických IgE
  - b) pruritus, chronická dermatitida, xeróza
  - c) pruritus, chronická dermatitida, pozitivní rodinná anamnéza atopie
  - d) pruritus, chronická dermatitida, alergie
2. **Proaktivní léčba atopické dermatitidy znamená:**
  - a) intervalová léčba
  - b) léčba pouze při zhoršení atopické dermatitidy
  - c) včasná léčba lokálními kortikoidy či imunomodulátory při prvních příznacích exacerbace
  - d) druh léčby předcházející před aktivní léčbou
3. **Pozitivita specifických IgE:**
  - a) je spojena s intrinzickou fází (formou) atopické dermatitidy
  - b) predikuje vždy těžký průběh
  - c) výše hodnot koreluje se závažností atopické dermatitidy
  - d) nemusí být přítomna
4. **Atopická dermatitida se dědí více:**
  - a) po matce
  - b) po otci
  - c) není rozdíl v dědičnosti ohledně pohlaví rodičů
  - d) při mladším věku rodičů
5. **Zlatý stafylokok na kůži u atopické dermatitidy:**
  - a) je neškodným symbiontem
  - b) vede k většímu pruritu a chronicitě atopické dermatitidy
  - c) nemá vliv na snížení účinnosti lokálních kortikoidů
  - d) je přítomen u většiny pacientů
6. **Alokineze u atopické dermatitidy znamená:**
  - a) nekoordinované škrábavé pohyby dané poruchou pohybového centra
  - b) pruritus u atopické dermatitidy vyvolaný pohybem
  - c) reagování atopika na různé podněty svěděním
  - d) souhyby končetin při svědění
7. **Lokální kortikosteroidy u atopické dermatitidy:**
  - a) začíná se vždy slabším a při malém efektu se přechází na silnější
  - b) se smí používat pouze slabé či středně silné
  - c) výběr síly se individuálně řídí podle závažnosti, věku a lokalizace
  - d) raději slabší po delší dobu než silnější po krátkou dobu
8. **Lokální imunomodulátory u atopické dermatitidy:**
  - a) jsou vhodné zejména k udržovací léčbě
  - b) se smí používat pouze intermitentně
  - c) nesmí se kombinovat s očkováním, i když se aplikují mimo místo vakcinace a na malou plochu
  - d) při aktivaci je třeba aplikace 2krát/den
9. **Lokální antibiotika u atopické dermatitidy se používají:**
  - a) kontinuálně či intermitentně k redukci stafylokoků na kůži
  - b) cíleně na základě zjištění citlivosti ze stěru na bakteriologické vyšetření
  - c) pouze při klinicky zjevné impetiginizaci
  - d) jen v kombinaci s antibiotiky celkovými
10. **Vhodná celková imunosupresiva pro dlouhodobou léčbu velmi těžké atopické dermatitidy jsou:**
  - a) cyklosporin A intermitentně
  - b) kortikosteroidy kontinuálně v nízkých dávkách
  - c) methotrexát v pulzním dávkování 1krát týdně
  - d) cyklofosfamid kontinuálně v nízkých dávkách

*Pozn. Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 6 kreditů kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakci jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Ti z vás, kteří chtějí být zařazeni do slosování o ceny 84. ročníku časopisu roku 2009, nechtě zašlou správné odpovědi na kontrolní test na adresu redakce (Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2) vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.*

Odpovědi na otázky kontrolního testu k článku publikovaném v č. 1/2009:

**MUDr. J. Říčař: Kožní onemocnění sportovců**

**Správné odpovědi:** 1b, 2bc, 3c, 4ad, 5bd, 6ad, 7bc, 8b, 9ad, 10bd