proLékaře.cz | 22.11.2026

DOŠKOLOVÁNÍ LÉKAŘŮ – KONTROLNÍ TEST

SOUČASNÉ TRENDY A NOVÉ MOŽNOSTI V LÉČBĚ MELANOMU

1. **Nejvýznamnější nezávislý prognostický faktor u melanomu je**:
   a) hloubka invaze do koria
   b) tloušťka nádoru měřená v mm
   c) klinicky popisovaná ulcerace nádoru
   d) absolutní počet mitóz

2. **Vyšetření sentinelové uzliny je:**
   a) elektivní disekce lymfatických uzlin
   b) léčebná metoda odstraňující postižené uzliny
   c) vyšetřovací stagingová metoda
   d) indikována pouze u nemocných s ulcerovanými nádory

3. **K adjuvantní léčbě jsou indikovány melanomy:**
   a) všechny od stadia II B
   b) všechny od stadia III A
   c) všechny s makroskopicky postiženými uzlinami
   d) pouze ve stadiích II B–III C

4. **Satelitní metastázy jsou**:
   a) drobná ložiska do vzdálenosti 2 cm od nádoru
   b) drobná ložiska v uzlinách do velikosti 2 mm
   c) 2 cm velká ložiska mezi nádorem a regionálními uzlinami
   d) metastatická ložiska do velikosti 2 cm

5. **Nejčastější adjuvantní léčbou melanomu je**:
   a) chemoterapie
   b) pouze imunoterapie
   c) kombinovaná chemoimunoterapie
   d) pouze léky zkoušené v klinických studiích

6. **Adjuvantní imunoterapie s IFN** α:
   a) je účinnější při vyvolání autoimunity
   b) významně prodlužuje přežívání nemocných s melanomem
   c) je indikována pouze u ulcerovaných nádorů
   d) má minimum vedlejších účinků

7. **V léčbě metastazujícího melanomu:**
   a) je indikována pouze chemoterapie a aktinoterapie
   b) většinou selhávají všechny standardní léčebné postupy
   c) má chemoimunoterapie nejméně léčebných odpovědí
   d) je využívána vysoká citlivost k chemoterapii

8. **Při imunitních reakcích vůči nádoru:**
   a) je výhodou tolerance k nádorovým buňkám
   b) je nutné zesílit expresi receptoru CTLA-4
   c) je problémem imunosuprese vyvolaná nádorem
   d) nevznikají nikdy autoimunitní reakce

9. **Účinnost anti CTLA-4 u metastazujícího melanomu**
   a) hodnotíme podle stejných kritérií jako účinnost chemoterapie
   b) procento léčebných odpovědí je výrazně vyšší než u chemoterapie
   c) léčebné odpovědi trvají déle
   d) k hodnocení používáme RECIST kritéria

10. **Nejúčinnější léčba melanomu je:**
    a) chemoterapie metastazujícího melanomu
    b) včasná diagnóza počínajícího melanomu
    c) léčba vakcínami
    d) cílená léčba

Pozn. **Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 6 kreditů kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakcí jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Ti z vás, kteří chtějí být zařazeni do slosování o ceny 85. ročníku časopisu roku 2010, nechť zašlou správné odpovědi na kontrolní test na adresu redakce (Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, U nemocnice 2, 128 00 Praha 2) vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.**

Odpovědi na otázky kontrolního testu k článku publikovaném v č. 3/2010:
Bučková H.: Mastocytózy u dětí
Správné odpovědi:**1c, 2b, 3d, 4d, 5a,d, 6b,c, 7d, 8b, 9c, 10a**