

Klinický případ: Bizarní chronické eroze na obličeji

Kodet O.^{1,2}, Dundr P.³, Lacina L.^{1,2}, Bělohradská H.¹, Štork J.¹

¹Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
přednosta prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

²Anatomický ústav 1. LF UK, Praha
přednosta prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

³Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha
přednosta prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.

Pacientem byl 93letý muž, který nikdy vážněji nestonal, dlouhodobě neužíval žádné léky, alergie neudával. Více než dva roky pozoroval nehojící se eroze zejména na čele a laterálních partiích obličeje, méně v oblasti výstřihu a proximálně na dorzálních stranách horních končetin. Lokální kortikosteroidy vedly jenom k přechodnému zlepšení, nikdy nedošlo k úplnému zhojení.


Probatorní excize z projevu ukázala subepidermální puchýř se zánětlivou reakcí v horním koriu. Diagnosticky byl zvažován bulózní pemfigoid, případně i jizvící pemfigoid, intenzita zánětlivé reakce svědčila spíše proti diagnó-

ze porfýrie. Vyšetření přímou imunofluorescencí nebylo provedeno, jelikož se pacient na další kontroly nedostavil. Při konziliárním vyšetření nemocného na našem pracovišti byly patrné na levé straně čela a na pravé straně obličeje dvě erodované, proti zdravé tkáni ostře ohraničené plochy s mírně vyvýšenou červenou spodinou velikosti 6 x 3 cm a 16 x 6 cm (obr. 1, 2). Jiné kožní projevy zastiženy nebyly.


Byla provedena probatorní biopsie z okraje erodované plochy k histologickému vyšetření (obr. 3) a z perilezionální kůže k vyšetření přímou imunofluorescencí, která vykazala pozitivitu v oblasti imunoglobulinu G a C3 komplementu (obr. 4).




Obr. 1



Obr. 3



Obr. 2



Obr. 4

HISTOLOGIE

Epidermis je zachována pouze v kraji excize, kde vykazuje mírnou spongiózu a lymfocytární exocytózu, zbytek vzorku je erodovaný. Povrch eroze je kryt fibrinem prostoupeným smíšeným zánětlivým infiltrátem. Horní třetina koria vykazuje jizevnatou novotvorbu vaziva a dále kolmo k povrchu probíhající kapiláry. V jejich okolí jsou přítomny rozsáhlé perivaskulární splývající infiltráty s převahou plazmacytů a přítomností četných Russelových tělísek. Tyto infiltráty jsou patrné i v dolní části excize, podkoží nebylo do biopsie zavzato. Místa jsou patrné obrovské mnohojaderné buňky typu z cizích těles v okolí vlasových stvolů. V superficiálních partiích vzorku je patrná příměs eozinofilů (obr. 3).

Imunohistochemický nále: Zastižené plazmatické buňky jsou směsná populace kappa a lambda pozitivních buněk.

Přímá imunofluorescence: C3 a IgG – lineární zrnitá IF podél bazální membrány epidermis (obr. 4).

Závěr: Nepříznačný obraz chronického jizevnatého procesu, vzhledem k pozitivní přímé imunofluorescenci v oblasti lineární podél bazální membrány v oblasti C3, je možno zvážit dg. lokalizovaného jizvícího pemfigoidu.

Závěr

Lokalizovaný jizvící pemfigoid typu Brunsting-Perry.

DISKUSE

V roce 1957 popsali Brunsting a Perry několik případů mužů vyššího věku, u kterých docházelo dlouhodobě k tvorbě subepidermálních puchýřů a patrná byla tendence k následnému jizvení. Unikátním rysem těchto případů však byla zejména lokalizace na hlavě a krku při úplné absenci postižení sliznic. Nově popsaná chorobná jednotka tedy byla považována za určitou variantu jizvícího pemfigoidu [1, 6].

Histologická vyšetření ve shodě s nálezy u jizvícího pemfigoidu popisují subepidermální puchýř a dermální leukocytární infiltrát složený z neutrofilů, lymfocytů a ve variabilní míře i z eozinofilů a plazmacytů. Biopsie ze starší léze mohou být již nepříznačné, jejich celularita může být již menší a převažovat mohou naopak fibroplastické nálezy výrazných kolagenních fibril orientovaných paralelně s povrchem epidermis.

Imunohistochemicky byla metodou přímé imunofluorescence později prokázána lineární imunodepozita podél bazální membrány epidermis. Užitečnou modifikací imunofluorescenčního vyšetření se u těchto případů ukázala metoda SSS (salt split skin, epidermis je v tomto případě odloučena od dermis pomocí 1 molárního roztoku chloridu sodného – toto arteficiální rozštěpení umožňuje zpřesnění lokalizace vazebního místa protilátky). Protílátky jsou nej-

častěji třídy IgG (respektive přesněji IgG4), často jsou zastižena i depozita C3 složky komplementu. Pozitivita v třídě IgA, IgM, či ve fibrinogenu je méně častá [5]. Nepřímá imunofluorescence (tj. vyšetření pacientova séra na substrátu jakým je např. opičí jícen) vykazuje pozitivitu ve třídě IgG jen u menší části pacientů (cca 20–30%) [5].

Molekulárně biologickými metodami byly určeny později autoantigeny obdobné jako u pemphigoid cicatricans, tedy zejména BPAG2 (podle molekulové hmotnosti BP 180). S postupem doby přibývalo ovšem pacientů s odlišnými jinými imunohistochemickými nálezy, auto-protílátky deponované lineárně v zóně bazální membrány reagovaly s autoantigeny jako BPAG1 (BP 230), laminin 5, $\alpha 6$ a $\beta 4$ integrin [2].

Velmi překvapivým zjištěním byla vazba autoprotílátek na kolagen VII. Nálezy u takových pacientů byly klinicky konzistentní s diagnózou jizvícího pemfigoidu typu Brunsting-Perry, ale imunohistochemicky se již náleze jednoznačně přiblížil formě epidermolysis bullosa acquisita (EBA) [3]. Vzhledem ke vzácnosti onemocnění a nevelkému počtu dokumentovaných případů nepanuje literárně dosud úplná shoda v zařazení těchto nálezu, utilitárně je možno tyto případy označovat jako Brunsting-Perry-like EBA [3].

Nicméně, spektrum zjištěných literárně publikovaných autoantigenů neustále a rychle roste (laminin 332, desmoplakin I a II; 1). K úplnému popisu a správnému zařazení některých pacientů je stejně jako u ostatních puchýřnatých onemocnění třeba i elektronová mikroskopie a některé jiné metody (např. Westernblotting, ELISA aj.). Jejich dosažitelnost může být v praxi problematická.

Terapeuticky je možno používat silná kortikoidní externa [6], nicméně jejich efekt je spíše morbostatický. U klasického jizvícího pemfigoidu byly s úspěchem užity i kalcineuronové inhibitory. Řada pacientů vyžaduje s ohledem na rozsah postižení zejména důkladnou ošetrovatelskou péči.

Systémové léky jistě zahrnují i kortikoidy, jejich efekt ale může být u některých případů relativně chabý, zejména u pacientů jejichž imunohistochemický náleze se blíží EBA, či u pacientů s omezujícími komorbiditami – tedy pokud iniciální dávka není dostatečně vysoká (cca pod 8 mg metylprednisolonu/kg/den; alespoň v počátku je výhodné i. v. podání, později možno převést na perorální formu s ekvivalentní dávkou, např. prednisonu v dávce 20–60 mg/den). Dobrých výsledků lze dosáhnout dapsone (50–200 mg/den), kolchicinem (1–2 mg/den), méně zkušeností je s azathioprinem (2–2,5 mg/kg/den), cyklofosfamidem (1–2 mg/kg/den), či mykofenolát mofetilem (1,0–2,5 mg/kg/den). Výhodná je kombinace kortikoidů a ostatních imunosupresiv, kortikoid je podáván v postupně snižující se dávce asi 6 měsíců a druhá účinná látka je postupně vysazována s odstupem dalších 6–12 měsíců za pravidelných kontrol klinického stavu a eventuálně laboratoře. Literárně je udáván určitý využitelný efekt antibiotik tetracyklinové řady, v našich podmínkách je zkušenost s tímto přístupem spíše limitovaná.

Málo používány jsou i intravenózní imunoglobuliny (IVIG), či monoklonální protilátky anti-CD20 (rituximab).

Při hodnocení možné asociace syndromu Brunsting-Perry s jinými chorobami je nutno se odkázat na poznatky zjištěné obecně u jizvického pemfigoidu. U některých pacientů (s pozitivitou protilátek proti epiligrinu) bylo maligní onemocnění přítomno již ve fázi vzniku prvních puchýřnatých projevů, u části z nich došlo k prokázání nádoru se zpožděním. Onkologický screening a dispenzarizace je tedy u takových pacientů jistě hodná doporučení. Popsány jsou i případy, kdy precipitujícím faktorem propuknutí tohoto onemocnění bylo trauma, či doprovodná farmaka (např. furosemid v kombinaci s osluněním) [5].

Závěrem lze konstatovat, že tento případ upozorňuje na stálý význam imunofluorescenčního vyšetření při bližším určování některých vzácnějších dermatóz.

Dermatol., 2011, [online], [cit. 2011-05-09]. URL: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2133.2011.10343.x/pdf>

3. JOLY, P., RUTO, F., THOMINE, E. et al. Brunsting-Perry cicatricial bullous pemphigoid: a clinical variant of localized acquiredepemphigoid? *J. Am. Acad. Dermatol.*, 1993, 28, s. 89–92.
4. KIM, J. H., KIM, Y. H., KIM, S. C. Epidermolysis bullosa acquisita: a retrospective clinical analysis of 30 cases. *Acta Derm. Venereol.*, 2011, 91, 3, s. 307–312.
5. MARTÍN, J. M., PINAZO, I., MOLINA, I. et al. Cicatricial pemphigoid of the Brunsting-Perry type. *Int. J. Dermatol.*, 2009, 48, 3, s. 293–294.
6. YANCEY, K. B. *Cicatricial pemphigoid*. In Wolff, K. et al. *Fitzpatrick's Dermatology in general medicine*. 7th Ed., New York, USA: Mc Graw Hill Medical, 2008, p. 481–485.

Podpořeno projektem UK – podpora specifického univerzitního výzkumu.

LITERATURA

1. CETKOVSKÁ, P. Autoimunitní bulózní dermatózy. *Čes-slov Derm*, 2006, 81, 4, s. 188–197.
2. FUKUDA, S., TSURUTA, D., UCHIYAMA, M. et al. Brunsting-Perry type pemphigoid with immunoglobulin G autoantibodies to laminin-332, BP230 and desmoplakins I/II. *Br. J.*

Do redakce došlo dne 14. 4. 2011.

*Kontaktní adresa:
MUDr. Lukáš Lacina, Ph.D.
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
e-mail: lukas.lacina@lf1.cuni.cz*

Moderně vybavená soukromá kožní ordinace v Klatovech

(cca 1 hod od Prahy)

přijme lékaře na částečný i plný úvazek.

Event. i bez atestace. Možnost profesního růstu.

Kompletní spektrum dermatovenerologických výkonů včetně dermatochirurgie, sklerotizací, celkové fototerapie...

Kompletní spektrum výkonů estetické dermatologie – botox, výplně, mesoterapie, epilační, cévní i ablační laser...

Přátelské a flexibilní prostředí. Nadprůměrný výdělek.

Nástup možný ihned. Ubytování zajistím.

Možné i pro důchodce jako občasný zástup.

Tel.: 376 322 023, sms 737 441 365.