

## DOŠKOLOVÁNÍ LÉKAŘŮ – KONTROLNÍ TEST

1. Odběr vzorku k vyšetření PIF u puchýřnatých chorob se správně provádí z:
  - a) puchýře
  - b) okolí puchýře
  - c) nepostižené kůže
  - d) čerstvého puchýře
2. U pemphigus foliaceus v PIF detekujeme:
  - a) ICS v celé epidermis
  - b) ICS v horní části epidermis
  - c) ICS v celé epidermis a pruh ve stratum granulosum
  - d) ICS v celé epidermis a pruh pod bazální membránou
3. Cílovým antigenem u EBA je
  - a) antigen BP2
  - b) antigen BP2 a laminin332
  - c) kolagen VII
  - d) kolagen IV
4. LABD je onemocnění
  - a) postihující často děti
  - b) s tvorbou IgA autoprotilátek proti kolagenu VII
  - c) s IF nálezem drobných precipitátů IgA v papilách
  - d) které je variantou DHD
5. U bulózního systémového lupusu se tvoří protilátky proti
  - a) lamina lucida bazální membrány
  - b) lamininu 332
  - c) proti NC1 doméně kolagenu IV
  - d) proti NC1 doméně kolagenu VII
6. Pemfigoid slizniční má depozita
  - a) ve stropě puchýře
  - b) ve spodině puchýře
  - c) pod bazální membránou
  - d) ve spodině nebo ve stropě puchýře
7. Fluorescence in situ hybridizace se používá
  - a) při detekci chromozomálních aberací
  - b) při detekci protilátek proti bazální membráně
  - c) ke studiu subpopulací lymfocytů
  - d) k detekci antinukleárních autoprotilátek
8. NaCl rozštěpí bazální membránu v
  - a) v stratum bazale
  - b) v lamina lucida
  - c) v stratum spinosum
  - d) pod lamina densa
9. U vaskulitid odebíráme
  - a) nejlépe rozvinutou morfu
  - b) morfu čerstvou do 24 hodin
  - c) puchýřek
  - d) nejlépe morfu z oblasti kotníků
10. V diagnostice puchýřnatých chorob běžně používáme sadu konjugátů
  - a) anti IgG, IgM, C3, Fb
  - b) anti IgG, IgM, IgA
  - c) anti IgG, IgA, IgM, C3, Fb
  - d) anti IgG, C3

**Pozn. Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 6 kreditů kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakci jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Odpovědi pošlete na adresu redakce (Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2) vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.**

Odpovědi na otázky kontrolního testu publikovaném v č. 3/2011:

**Velčevský P.: Pityriasis rubra pilaris**

Správné odpovědi: 1.b, 2.b, 3.a, 4.d, 5.d, 6.d, 7.a, c, d, 8. c, 9. b, 10. c