

DOŠKOLOVÁNÍ LÉKAŘŮ – KONTROLNÍ TEST

1. **Mezi dermatoskopické nálezy u svrabu nepatří:**
 - a) tmavá trojúhelníková struktura připomínající rogalo
 - b) nález připomínající tryskové letadlo s kondenzační stopou
 - c) přehledný obraz těla zákožky při použití větších zvětšení
 - d) mnohočetné šedomodré pigmentované globule
2. **Větší nepravidelné černé tečky a červenočerné globule nacházíme nejčastěji v dermatoskopickém obrazu virových bradavic lokalizovaných na:**
 - a) obličeji
 - b) trupu
 - c) ploskách
 - d) genitálu
3. **Vykřičníkované vlasy nacházíme v dermatoskopickém obrazu u:**
 - a) trichotillománie
 - b) alopecie areata
 - c) alopecie androgenica
 - d) jizvící alopecie
4. **Při podezření na poruchu rohování a dermatoskopickém nálezu pravidelně uspořádaných, drobných červených tečkovitých cévních struktur se velice pravděpodobně jedná o:**
 - a) psoriázu
 - b) lichen planus
 - c) porokeratózu
 - d) ani jedno z výše uvedených onemocnění
5. **Kapilaroskopie nehtových valů se v praxi používá především u nemocných s:**
 - a) chronickým ekzémem
 - b) systémovým onemocněním pojiva
 - c) onychomykózou
 - d) periunguálními bradavicemi
6. **Dermatoskopický nález tečkovitých nebo glomeruloidních cév v pravidelném uspořádání připomínajícím řetízky perel je typický pro:**
 - a) bazaliom
 - b) akantom ze světlých buněk
 - c) aktinickou keratózu
 - d) morbus Bowen
7. **Dermatoskopický obraz pigmentované varianty aktinické keratózy silně připomíná:**
 - a) lentigo maligna
 - b) sebaceózní hyperplazii
 - c) bazaliom s pigmentem
 - d) melasma
8. **Dermatoskopický obraz připomínající duhu je typický pro:**
 - a) Kaposiho sarkom
 - b) amelanotický melanom
 - c) spinaliom
 - d) rozaceu
9. **Dermatoskopické vyšetření může mít význam s ohledem na efekt léčby laserem u:**
 - a) rozacey
 - b) hemangiomu
 - c) pavoučkového névu
 - d) ohně (nevus flammeus)
10. **Žlutobílé globule odpovídající folikulární hyperkeratóze a erytém s ektáziemi odpovídající atrofii je dermatoskopický nález typický pro:**
 - a) ložiskovou sklerodermii
 - b) stasis dermatitidu
 - c) chronický lupus erythematosus
 - d) superficiální bazaliom

Pozn. Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 2 kredity* kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakci jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Odpovědi pošlete na adresu redakce (Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2) vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.

Odpovědi na otázky kontrolního testu publikovaném v č. 1/2012:

Novák M.: Andrologie – součást dermatovenerologie. Základy andrologického vyšetření

Správné odpovědi: 1a, 2a, 3c, 4b, 5c, 6b, 7c, 8b, 9b, 10a, c.

*Podle přílohy č. 1 k § 4 odst. 1 písm. f) a § 11 Stavovského předpisu ČLK č. 16 – platné od 25. 1. 2012.