

## Kontrolní test

1. **Která diagnóza nepatří mezi chronické kopřivky?**
  - a) urticaria cholinergica
  - b) urticaria e frigore
  - c) urticaria solaris
  - d) urticaria pigmentosa
2. **Co hodnotíme při zjišťování UAS (Urticaria Activity Score)?**
  - a) pomfy a angioedém
  - b) pomfy a pruritus
  - c) pomfy a nutnost užívání antihistaminik
  - d) pruritus a angioedém
3. **Pacienti s akutní kopřivkou by měli:**
  - a) především 3–4 týdny držet dietu s omezením pseudoalergenů
  - b) užívat antibiotika k léčbě možných infekčních fokusů
  - c) podstoupit základní onkoscreening (RTG plic, PSA atd.)
  - d) být primárně léčeni nesedativními antihistaminiky, bez dalšího podrobnějšího vyšetřování
4. **Co nepatří do diferenciální diagnostiky u kopřivky?**
  - a) Schnitzlerův syndrom
  - b) urticaria vasculitis
  - c) ACE – inhibitory indukovaný angioedém
  - d) Gorlinův syndrom
5. **Co je standardní léčbou chronické kopřivky?**
  - a) sedativní antihistaminika podávaná na noc
  - b) bolus kortikosteroidů v první linii léčby
  - c) nesedativní antihistaminika druhé generace v první linii léčby
  - d) dieta s omezením pseudoalergenů
6. **Který preparát není podle nejnovějších doporučení vhodný k léčbě kopřivky?**
  - a) H1 – antihistaminika
  - b) kortikosteroidy
  - c) dapson
  - d) montelukast
7. **Která terapie je doporučována jako druhý krok u chronické kopřivky při selhání léčby první linie?**
  - a) výměna H1 – antihistaminika
  - b) přidání sedativního antihistaminika první generace na noc ke stávající terapii
  - c) přidání montelukastu ke stávající terapii
  - d) navýšení dávky H1 – antihistaminika druhé generace až na 4násobek základního dávkování
8. **Co nepatří do histologického obrazu kopřivky?**
  - a) edém kória
  - b) dilatace postkapilárních venul
  - c) parakeratóza
  - d) perivaskulární zánětlivý infiltrát
9. **Omalizumab je:**
  - a) anti TNF $\alpha$  protilátka
  - b) anti IgE protilátka
  - c) lék první volby u hereditárního angioedému
  - d) EGFR inhibitor
10. **Pro urticaria vasculitis platí, že:**
  - a) patří mezi fyzikální kopřivky
  - b) je vyvolána působením zvýšené teploty
  - c) mohou být postiženy vnitřní orgány
  - d) pomfy trvají 2–3 hodiny

*Pozn.* Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 2 kredity kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakcí jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Odpovědi pošlete na e-mailovou adresu redakce: kozni@lfl.cuni.cz vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.

Odpovědi na otázky kontrolního testu publikovaném v č. 1/2014:

**Bienová, M.: Dermatoskopická diagnostika alopecí**

**Správné odpovědi: 1b, 2b, 3b, 4d, 5a, 6d, 7b, 8c, 9b, 10c.**