

# DOŠKOLOVÁNÍ LÉKAŘŮ

## KONTROLNÍ TEST

**1. K pustulózním formám psoriázy patří:**

- a) akutní generalizovaná exantematická pustulóza (AGEP)
- b) palmoplantární pustulózní psoriáza
- c) generalizovaná pustulózní psoriáza
- d) acrodermatitis continua suppurativa (Hallopeau)

**2. Impetigo herpetiformis je:**

- a) impetigo komplikované herpetickou infekcí
- b) impetigo s herpetiformně konfigurovanými eflorescencemi
- c) zvláštní forma generalizované pustulózní psoriázy postihující gravidní ženy
- d) vzácná bakteriální infekce postihující imunosuprimované pacienty

**3. Generalizovaná pustulózní psoriáza (GPP):**

- a) může být kombinována s příznaky běžné psoriázy
- b) familiární formy GPP a formy bez asociace s běžnou psoriázou jsou zpravidla způsobeny mutací IL36RN
- c) jde o závažný stav vyžadující komplexní péči
- d) může postihovat dospělé i děti

**4. Palmoplantární pustulózní psoriáza (PPP):**

- a) vazba na HLA lokusy typické pro běžnou psoriázu často chybí
- b) může být asi ve 20 % případů asociována s projevy běžné psoriázy
- c) u většiny případů je navozena dlouhodobá remise při zevní terapii
- d) nikdy nebývá spojena s projevy artritidy

**5. V terapii GPP preferujeme:**

- a) z konvenčních preparátů cyklosporin
- b) z konvenčních preparátů acitretin
- c) z biologických preparátů infliximab a adalimumab
- d) z biologických preparátů etanercept

**6. Kombinace infliximab + metotrexát:**

- a) výrazně zvyšuje toxicitu léčby, a proto ji v dermatologii nikdy nepoužíváme
- b) metotrexát snižuje tvorbu protilátek proti infliximabu, a snižuje tak riziko infuzních reakcí a selhání léčby
- c) použití je možné pouze u imunitně podmíněných artritid
- d) v dermatologii je možná pouze u PPP

**7. Systémová terapie kortikosteroidy:**

- a) u těžkých forem psoriázy je plně indikovaná
- b) snažíme se jí v terapii psoriázy vyhnout z důvodu rizika další akcelerace onemocnění
- c) impetigo herpetiformis je možnou indikací
- d) používáme ji v 1. linii léčby PPP

**8. Paradoxní lékové reakce:**

- a) je situace, kdy lék primárně indikovaný k terapii určitého onemocnění tuto chorobu indukuje
- b) v dermatologii jsou poměrně časté po užití inhibitorů TNF alfa
- c) nejčastěji mají charakter bulózních kožních reakcí
- d) vyskytuje se pouze u žen

**9. Pustulózní artroosteitida (Sonozaki) je:**

- a) kombinace GPP a artrózy nosných kloubů
- b) kombinace PPP a artrózy nosných kloubů
- c) kombinace PPP a artritidy sternoklavikulárního nebo manubriosternálního skloubení
- d) synonymum pro acrodermatitis continua suppurativa (Hallopeau)

**10. Secukinumab je:**

- a) monoklonální protilátku určená k terapii chronické spontánní kopřivky
- b) monoklonální protilátku určená k terapii maligního melanomu
- c) monoklonální protilátku proti IL 17 A určená k terapii pemfigu
- d) monoklonální protilátku proti IL 17 A určená k terapii psoriázy

*Pozn.* Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 2 kredity kontinuálního vzdělávání lékarů ČLK, které budou zasílány redakcí jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Odpovědi posílejte na e-mailovou adresu: [kozni@lf1.cuni.cz](mailto:kozni@lf1.cuni.cz) vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.

Odpovědi na otázky kontrolního testu v č.5/2015

Kučerová R., Bienová M.: Difuzní řídnutí vlasů u žen v klinické praxi

Správné odpovědi: 1a, 2c, 3c, 4b, 5d, 6a, 7c, 8d, 9d, 10c.