

DOŠKOLOVÁNÍ LÉKAŘŮ

KONTROLNÍ TEST

1. **Vyšší výskyt iritační kontaktní dermatitid u žen je dán:**
 - a) tenčí epidermis
 - b) vyšší kožní permeabilitou kůže
 - c) zvýšenými transepidermálními ztrátami vody
 - d) vyšší expozicí vodě a detergentům
2. **Mezi typické vyvolavatele iritační kontaktní dermatitidy patří:**
 - a) voda
 - b) detergenty a saponáty
 - c) fyzikální faktory (vysoká teplota, chlad, vítr)
 - d) vše z uvedeného
3. **Klinické projevy airborne kontaktní dermatitidy se vyskytují:**
 - a) v místě primárního kontaktu (primární lokalizace)
 - b) na odhalených partiích těla
 - c) v záhybech oděvů nebo v podpažích
 - d) B a C je správně
4. **Histopatologické vyšetření u kontaktních dermatitid:**
 - a) je základním vyšetřením potvrzujícím klinickou diagnózu
 - b) je schopné odlišit alergickou, iritační a proteinovou kontaktní dermatitidu
 - c) je specifické pouze pro alergickou kontaktní dermatitidu
 - d) není specifické a nemůže stanovit přesnou klinickou diagnózu
5. **Základní vyšetřovací metodou u kontaktních dermatitid jsou:**
 - a) epikutánní testy
 - b) prick testy
 - c) eliminační a expoziční testy
 - d) vše z uvedeného
6. **Rozvoj kontaktní senzibilizace je podmíněný:**
 - a) pohlavím
 - b) individuální dispozicí organismu
 - c) věkem
 - d) rasovou příslušností
7. **Kontaktní senzibilizace u dětí:**
 - a) nelze indukovat pro nezralý imunitní systém
 - b) ne možné indukovat u novorozenců a kojenců
 - c) má odlišné klinické projevy od dospělých
 - d) může vyhasnout v průběhu života
8. **Proteinová kontaktní dermatitida:**
 - a) má stejný mechanismus jako alergická kontaktní dermatitida
 - b) k diagnostice stačí pouze epikutánní testy
 - c) vyvolavatelem je alergen bílkovinné povahy
 - d) nehrozí u ní nebezpečí anafylaktické reakce
9. **Systémová kontaktní dermatitida:**
 - a) nevyžaduje předchozí kontaktní senzibilizaci
 - b) je vyvolána inhalační expozicí kontaktnímu alergenu
 - c) u níklu se zlepšuje po dietních opatřeních
 - d) nebyla popsána po solích kovů
10. **Fototoxická dermatitida:**
 - a) není vyvolána furokumariny v rostlinách
 - b) je často profesionální etiologie
 - c) může mít charakter bulózní dermatitidy
 - d) je imunologicky podmíněná

Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 2 kredity kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakci jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Odpovědi posílejte na **e-mailovou adresu kozni@lf1.cuni.cz** vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.

Odpovědi na otázky kontrolního testu v č. 2/2016

Humhejová, D.: Tuberózní skleróza

Správné odpovědi: **1b, 2a,b,c, 3a,c,d, 4b,c, 5b, 6a,c,d, 7b, 8c,d, 9b, 10b,c.**